

[Tessier JP \(1852\)](#). De la médication homoeopathique. [On homoeopathic medication] Paris: JB Baillièrè.

Title pages

DE LA
MÉDICATION HOMŒOPATHIQUE

SUIVI D'UN RELEVÉ COMPARATIF

DES MALADES TRAITÉS A L'HOPITAL SAINTE-MARGUERITE

PAR LA MÉTHODE DE HAHNEMANN

ET

PAR LA MÉTHODE ORDINAIRE,

PENDANT LES ANNÉES 1849, 1850, 1851.

RÉPONSE A LA LETTRE DU DOCTEUR FRÉDAULT,

PAR

LE DOCTEUR J. P. TESSIER,

Médecin de l'hôpital Sainte-Marguerite.



A PARIS

CHEZ J. B. BAILLIÈRE

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE,

RUE HAUTEFEUILLE, 19;

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET:

A NEW-YORK, CHEZ H. BAILLIÈRE, 290, BROADWAY:

A MADRID, CHEZ C. BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.

—
1852

Key passages

HOPITAL SAINTE-MARGUERITE.

Résumé d'un relevé comparatif des malades traités dans ledit hôpital, pendant les années 1849, 1850 et 1851, par la médecine homœopathique, dans les salles Saint-Benjamin et Sainte-Anne composées de 100 lits; et par la médecine ordinaire, salles Saint-Augustin et Sainte-Geneviève composées de 89 lits.

Nota. La différence qui existe chaque année entre le nombre des entrants d'une part, et d'autre part le nombre des sortants et des décédés, tient aux malades restés en traitement, et qui figurent dans le nombre des sortants et des morts des années suivantes.

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE.

| | | | |
|-------|--------------------------|---|--|
| 1849. | Sur 870 hommes entrants | 780 sont sortis, soit 89 ⁸⁵ / ₁₀₀ sur cent; | 75 sont décédés, soit 8 ⁸² / ₁₀₀ |
| — | — 422 femmes | — 89 ⁸⁷ / ₁₀₀ | — 51 — 12 ⁹⁸ / ₁₀₀ |
| — | — 1292 h. et f. | — 89 ⁸⁵ / ₁₀₀ | — 126 — 9 ⁷⁵ / ₁₀₀ |
| ----- | | | |
| 1850. | Sur 966 hommes entrants | 896 sont sortis, soit 92 ⁷⁶ / ₁₀₀ sur cent; | 63 sont décédés, soit 6 ⁸³ / ₁₀₀ |
| — | — 711 femmes | — 88 ⁸⁸ / ₁₀₀ | — 75 — 10 ⁸⁴ / ₁₀₀ |
| — | — 1677 h. et f. | — 91 ⁸¹ / ₁₀₀ | — 138 — 8 ⁸² / ₁₀₀ |
| ----- | | | |
| 1851. | Sur 1085 hommes entrants | 997 sont sortis, soit 91 ⁸⁹ / ₁₀₀ sur cent; | 70 sont décédés, soit 6 ⁸⁵ / ₁₀₀ |
| — | — 609 femmes | — 91 ⁸² / ₁₀₀ | — 65 — 10 ⁸⁷ / ₁₀₀ |
| — | — 1694 h. et f. | — 91 ⁷⁹ / ₁₀₀ | — 135 — 7 ⁸⁶ / ₁₀₀ |

Pendant les trois années 1849, 1850 et 1851, il y a eu, dans le service de l'homœopathie, 399 décès sur 4663 entrants, soit 8 ⁸⁵/₁₀₀, soit 85 pour 1000.

MÉDECINE ORDINAIRE.

| | | | |
|-------|-------------------------|---|---|
| 1849. | Sur 689 hommes entrants | 595 sont sortis, soit 86 ⁸⁶ / ₁₀₀ sur cent; | 87 sont décédés, soit 12 ⁸² / ₁₀₀ |
| — | — 398 femmes | — 79 ⁸⁹ / ₁₀₀ | — 82 — 20 ⁸² / ₁₀₀ |
| — | — 1087 h. et f. | — 83 ⁸⁰ / ₁₀₀ | — 169 — 14 ⁷¹ / ₁₀₀ |
| ----- | | | |
| 1850. | Sur 754 hommes entrants | 692 sont sortis, soit 91 ⁷⁷ / ₁₀₀ sur cent; | 61 sont décédés, soit 8 ⁸¹ / ₁₀₀ |
| — | — 441 femmes | — 89 ⁸⁴ / ₁₀₀ | — 46 — 10 ⁸³ / ₁₀₀ |
| — | — 1195 h. et f. | — 90 ⁸⁷ / ₁₀₀ | — 107 — 8 ⁸⁹ / ₁₀₀ |
| ----- | | | |
| 1851. | Sur 901 hommes entrants | 828 sont sortis, soit 91 ⁸⁸ / ₁₀₀ sur cent; | 77 sont décédés, soit 8 ⁸⁴ / ₁₀₀ |
| — | — 541 femmes | — 86 ⁸⁶ / ₁₀₀ | — 58 — 10 ⁷⁸ / ₁₀₀ |
| — | — 1442 h. et f. | — 89 ⁸⁰ / ₁₀₀ | — 135 — 9 ⁸⁶ / ₁₀₀ |

Pendant les années 1849, 1850 et 1851, il y a eu, dans le service de la médecine ordinaire, 411 décès sur 3724 entrants, soit 11 ⁸¹/₁₀₀, soit 113 pour 1000.

FIN.

From: Ozanne J (1853). Homoeopathy tested by statistics.
 Homoeopathic Times 4:372-375.

HOMŒOPATHIC TREATMENT.

| | | | |
|-------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1849. | Of 870 men admitted | 780 went out, or 89·65 per cent. | 75 died, or 8·62 per cent. |
| „ | „ 422 women „ | 378 „ 89·57 „ | 51 „ 12·08 „ |
| „ | „ 1292 men & women | 1158 „ 89·62 „ | 126 „ 9·75 „ |
| 1850. | Of 966 men admitted | 896 went out, or 92·75 per cent. | 63 died, or 6·52 per cent. |
| „ | „ 711 women „ | 632 „ 88·88 „ | 75 „ 10·54 „ |
| „ | „ 1677 men & women | 1528 „ 91·11 „ | 138 „ 8·22 „ |
| 1851. | Of 1085 men admitted | 997 went out, or 91·89 per cent. | 70 died, or 6·45 per cent. |
| „ | „ 609 women „ | 558 „ 91·62 „ | 65 „ 10·67 „ |
| „ | „ 1694 men & women | 1555 „ 91·79 „ | 135 „ 7·96 „ |

During the three years 1849, 1850, and 1851 there were in the homœopathic wards 399 deaths, out of 4663 admissions, or 8·55 per cent., or 85 per 1000.

ORDINARY TREATMENT.

| | | | |
|-------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1849. | Of 689 men admitted | 595 went out, or 86·35 per cent. | 87 died, or 12·62 per cent. |
| „ | „ 398 women „ | 316 „ 79·39 „ | 82 „ 20·62 „ |
| „ | „ 1087 men & women | 911 „ 83·80 „ | 169 „ 14·71 „ |
| 1850. | Of 754 men admitted | 692 went out, or 91·77 per cent. | 61 died, or 8·08 per cent. |
| „ | „ 441 women „ | 394 „ 89·34 „ | 46 „ 10·43 „ |
| „ | „ 1195 men & women | 1086 „ 90·87 „ | 107 „ 8·99 „ |
| 1851. | Of 901 men admitted | 828 went out, or 91·88 per cent. | 77 died, or 8·54 per cent. |
| „ | „ 541 women „ | 467 „ 86·34 „ | 58 „ 10·72 „ |
| „ | „ 1442 men & women | 1295 „ 89·30 „ | 135 „ 9·36 „ |

During the years 1849, 1850, and 1851 there were in the allopathic wards 411 deaths, out of 3724 admissions, or 11·03 per cent., or 110† per 1000.

* De la Médication Homœopathique, etc. B. J. Baillièrè, Paris, 1852.

† The *British Journal of Homœopathy* has copied a misprint in M. Tessier's tables; the above are the correct figures.